



Протокол прижизненного патологоанатомического исследования

биопсийного (операционного) материала

Номер штрих-кода: 3382318714

Сведения о пациенте

ФИО пациента:
Дата рождения:
Местность:
Заказчик:
Врач ЛПУ:

Пол:
Страховой полис:
№ ИБ:

Диагноз по МКБ (по данным направления): N40 Гиперплазия предстательной железы

Дата и время забора материала по данным направления:

Материал доставлен в 10%-ный раствор нейтрального формалина : да

Отметка о сохранности упаковки : да

Регистрационный номер:

Категория сложности: 5

Вырезка проводилась:

В проводку взято: 12

Количество блоков: 12

Количество стекол: 12

Макроскопическое описание: 1 флакон (базально-латеральный справа) - столбик желто-белого цвета длиной 1,5 см, диаметром 0,2 см (26-001237/1);

2 флакон (средне-латеральный справа) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/2);

3 флакон (апикально-латеральный справа) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/3);

4 флакон (базально-медиальный справа) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/4);

5 флакон (средне-медиальный справа) - столбик желто-белого цвета длиной 1,5 см, диаметром 0,2 см (26-001237/5);

6 флакон (апикально-медиальный справа) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/6);

7 флакон (базально-медиальный слева) - столбик желто-белого цвета длиной 1,5 см, диаметром 0,2 см (26-001237/7);

8 флакон (средне-медиальный слева) - столбик желто-белого цвета длиной 1,5 см, диаметром 0,2 см (26-001237/8);

9 флакон (апикально-медиальный слева) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/9);

10 флакон (базально-латеральный слева) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/10);

11 флакон (средне-латеральный слева) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/11);

12 флакон (апикально-латеральный слева) - столбик желто-белого цвета длиной 2,0 см, диаметром 0,2 см (26-001237/12).

Микроскопическое описание: 1 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

2 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

3 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными и атрофичными ацинусами, выполненными низким и высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

4 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

5 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

6 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

7 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, и фокусом ацинарной карциномы занимающей менее 3% протяженности столбика (менее 1 мм).

8 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

9 флакон: Столбик ткани предстательной железы с гиперплазированными ацинусами, выполненными высоким светлым эпителием с базально расположенными ядрами, без признаков атипии.

10 флакон: Фрагментированный столбик ткани предстательной железы с ростом ацинарной карциномы, занимающей 20% протяженности столбика (5,5 мм), сумма по Gleason 6 (3+3), без признаков перинеуральной инвазии. На остальном протяжении определяются гиперплазированные ацинусы. В строме слабая лимфоидная инфильтрация.

11 флакон: Столбик ткани предстательной железы с ростом ацинарной карциномы, занимающей 30% протяженности столбика (3 мм), сумма по Gleason 6 (3+3), без признаков перинеуральной инвазии. На остальном протяжении определяются гиперплазированные ацинусы. В строме слабая лимфоидная инфильтрация.

Заказ № Пациент:

12 флакон: Фрагментированный столбик ткани предстательной железы с ростом ацинарной карциномы, занимающей 50% протяженности столбика (5,5 мм), сумма по Gleason 6 (3+3), без признаков перинеуральной инвазии. На остальном протяжении определяются гиперплазированные ацинусы. В строме слабая лимфоидная инфильтрация.

Заключение : Ацинарная карцинома предстательной железы с поражением левой доли предстательной железы, градирующая группа 1, сумма по Gleason 6 (3+3), без признаков перинеуральной инвазии.

Код по МКБ: С61 Злокачественное новообразование предстательной железы

Комментарии к заключению и рекомендации: Случай консультирован зав. лабораторией патоморфологии Валеевой А.Е.

Врач-патологоанатом:.

Зав. патоморфологической лабораторией А. Е. Валеева

Дата выполнения исследования:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения города Москвы"
ОГРН 1027739811770, ИНН 7724015205, КПП 772401001 Лицензия № Л041-01137-77/00367740 от 12 октября 2020 г.

